

הסבר לפני ביצוע פעולות פולשניות בדימות

מרפאת כאב

מטופל/ת יקר/ה,

נקבע עבורך טיפול פולשני בדימות - הזרקה תחת שיקוף רנטגן ו/או אולטרסאונד.

מידע על הטיפול:

מטרת הטיפול - שיכוך כאב ואבחון מדויק של מקור הכאב.
 הזרקות תחת שיקוף (רנטגן) ו/או אולטרסאונד מתבצעות על ידי רופא/ה מנוסה בטיפול בכאב.
 הטיפול מתבצע ברך כלל בהרדמה מקומית, לעיתים קרובות עם תוספת הרגעה.
 במהלך הבדיקה יבוצע ניטור מתאים של סימנים חיוניים (כגון: לחץ דם, דופק, סטורציה).
 זמן הטיפול כחצי שעה. שחרור בהתאם למצב, כחצי שעה לאחר הטיפול.

הנחיות כלליות לפני הטיפול:

- עליך להביא את כל התרופות שאת/ה נוטל/ת באופן קבוע באריזה מקורית.
- עלייך לדווח לרופא/ה ולאח/ות על רגישות לתרופות או למזון (אלרגיה).
- תרופות נוגדות קרישה - אין אפשרות לבצע זריקה בלקיחת תרופות אלו במידה ואת/ה נוטל/ת תרופות נוגדות קרישה עליך לדווח על כך לצוות המטפל בהקדם האפשרי ולהיוועץ עם רופא/ת משפחה / קרדיולוג/ית / נירולוג/ית לגבי הסיכון שבהפסקת לקיחת התרופה לפני תחילת הטיפול.

שם התרופה	יש להפסיק את נטילת התרופה לפני תחילת הטיפול בהתאם לזמן המצוין
Warfarin (Coumadin) [®]	4-5 ימים יש להביא תשובת INR פחות 1.2
Clopidogrel (Plavix, Clopidexel) [®]	7-10 ימים
Prasugrel (Effent) [®]	7-10 ימים
Ticagrelor (Brilinta) [®]	5 ימים
Ticlopidine (Ticlidil) [®]	10-14 ימים
Apixabaj (Eliquis) [®]	3-5 ימים (מינימום 72 שעות)
Rivaroxaban (Xarelto) [®]	3 ימים
Dabigatran (Pradaxa) [®]	4-6 ימים (מינימום 96 שעות)
Edoxaban (Lixiana) [®]	3 ימים
Acenocoumarol (Sintrom) [®]	3 ימים יש לבצע INR פחות 1.2
Enoxaparin (Clexane) [®]	24 שעות

- עליך להגיע **בצום** של 6 שעות לפני הטיפול
- ביום הטיפול יש לקחת את התרופות הקבועות (ניתן לקחת עם לגימת מים), פרט לטיפול בסוכרת (למטופל שמנצא בצום).
- יש להפסיק לקחת אספירין 5 ימים לפני הטיפול
- יש להגיע עם מלווה, אסור לנהוג במהלך 8 שעות שלאחר הטיפול.

לאחר הטיפול:

- מומלצת מנוחה ביום הטיפול
- לאחר הטיפול ניתן לאכול ולשתות.
- מותר להתרחץ 4 שעות לאחר הטיפול.
- לעיתים לאחר הטיפול יש תחושות שונות כגון: נימול, כאבים, זרמים - שחולפות לאחר מספר ימים, ניתן לקחת משככי כאבים בהתאם להנחיות הרופא/ה המטפל/ת או בהתאם לטיפול אותו את/ה עובר/ת.
- יש לרשום את התחושות ואומדן הכאב ביום הראשון שלאחר הטיפול, בהתאם להדרכה שקיבלת ולדווח לרופא/ה המטפל/ת בביקור הבא.
- במידה ולאחר הטיפול ישנה החמרה משמעותית של כאבים או שמופיעה חולשה שלא היתה קודם לכן, יש לפנות לרופא בקהילה או לחדר מיון.